

ПРИВИВКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА

В России с 2000 года нет ни одного случая заболевания полиомиелитом, а в 2001 года наша страна была сертифицирована по его отсутствию Европейским Бюро Всемирной организации здравоохранения. Однако, пока в других странах и государствах полиомиелит имеет место, продолжает сохраняться угроза распространения этой опасной для здоровья и жизни инфекции.

Полиомиелит представляет собой острое инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг, а в ряде случаев – головной, и нередко приводящее к смертельному исходу.

Возбудители болезни – полиовирусы – довольно устойчивы по внешней среде: особенно долго они живут в воде, в течение нескольких лет сохраняют свою активность при замораживании. Известны 3 типа полиовируса. Поэтому после перенесенного заболевания устанавливается иммунитет только против того типа вируса, который вызвал заболевание.

Существуют 2 пути передачи инфекции:

- 1) через грязные руки, воду, пищевые продукты. Этот путь называется фекально-оральным, так как вирусы выделяются во внешнюю среду больным человеком с фекалиями и сохраняются в почве, воде до нескольких месяцев;
- 2) воздушно-капельный путь, когда вирусы распространяются во время кашля и чихания от больного или вирусоносителя, т.е. человека, не имеющего признаков болезни, но в слизистой оболочке носоглотки которого находится возбудитель инфекции.

От момента заражения до проявления заболевания может пройти от 4 до 30 дней. Попав в организм человека, вирус через слизистые оболочки носоглотки или пищеварительного тракта поступает в лимфатическую систему и кровь и направляется к спинному и головному мозгу.

Восстановление утраченных функций – процесс длительный. Остаточные явления характеризуются стойкими вялыми параличами, укорочением и деформацией пораженных конечностей, а также может развиться тяжелая инвалидность.

Заподозрить полиомиелит родители могут по вынужденной позе ребенка: он запрокидывает голову; садясь, опирается на постель отведенными назад руками. Поэтому, если поведение и состояние ребенка вызвало у родителей беспокойство необходимо без промедления обратиться к врачу.

Единственным средством профилактики является вакцинация. Согласно Национальному Календарю прививок РФ она начинается с 3-х месячного возраста. К 12 месяцам малыш получает 3 прививки. Затем, для закрепления иммунитета они делаются в 18 и 20 месяцев. И далее однократно в 14 лет.

В России используют отечественные и зарубежные вакцины. Иммунизация проводится как ОПВ (оральной полиомиелитной вакциной), так и ИПВ (инактивированной полиомиелитной вакциной). ИПВ используется в случаях, когда

противопоказана ОПВ (детям, страдающим расстройствами центральной нервной системы, иммунодефицитными состояниями, ВИЧ-инфицированным). Эти вакцины взаимозаменяемы.

Прививки не делаются при наличии острого или обострения хронического заболевания до выздоровления. При нетяжелых острых респираторных вирусных инфекциях с повышением температуры тела до 38°C прививки откладывают до нормализации температуры. Строгим противопоказанием к ИВП является аллергическая реакция на стрептомицин.

При возникновении заболевания в семье вакцинируются все контактные, ранее не привитые.

**ПОМНИТЕ! Только прививка защитит от возврата инфекции,
сохранит здоровье и жизнь!**